

## ERATĂ / AN ERRATUM

### REZULTATE ȘI CARACTERISTICI ALE CANCERELOR DE PIELE NON-MELANONCITARE ȘI ALE KERATOZEI ACTINICE LA UN PACIENT CU MIELOFIBROZĂ ÎN TRATAMENT CU FEDRATINIB

### RESULTS AND CHARACTERISTICS OF NON-MELANOCYTIC SKIN CANCERS AND OF ACTINIC KERATOSIS IN A PATIENT WITH MYELOFIBROSIS UNDER TREATMENT WITH FEDRATINIB

#### 1. Pagina (page) 16

- and basal cell carcinoma on the left shoulder.
- și carcinom bazocelular la nivelul umărului stâng.

#### 2. Pagina (page) 18

- On histopathological examination were identified lesions of actinic keratosis surrounding the SCC (Figure 10 and Figure 11), and on the left infraorbital region of ulcerated Bowenoid actinic keratosis was diagnosed ( Figure 12).
- La examinarea histopatologică s-au identificat leziuni de keratoză actinică asociate leziunilor de carcinom scuamos (Figurile 10 și 11), iar la nivelul regiunii infraorbitale stângi s-a evidențiat keratoză actinică ulcerată bowenoidă, aspect prezentat în (Figura 12).

| Skin lesion location       | Biopsy                                                                 | Excision                                                                                                                                                            | TNM staging   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Right preauricular         | Well differentiated squamous cell carcinoma, with superficial invasion | Well differentiated squamous cell carcinoma, keratoacantoma-like, with in situ lesion and multifocal, bowenoid and proliferative actinie keratosis                  | pT1           |
| Nasolabial fold - superior | benign                                                                 | Intradermal nevus                                                                                                                                                   | benign        |
| Nasolabial fold - inferior | Basal cell carcinoma                                                   | Multifocal nodular basal cell carcinoma                                                                                                                             | pT1           |
| Presternal                 | Well differentiated squamous cell carcinoma                            | Well differentiated squamous cell carcinoma with in situ lesion and proliferative actinie keratosis. Lympho-vascular invasion + (LVI 1) Perineural invasion + (Pnl) | pT1           |
| Left shoulder              | Basal cell carcinoma                                                   | Ulcerated nodular basal cell carcinoma                                                                                                                              | pT1           |
| Left infraorbital          | Actinie keratosis with plasmocytosis                                   | Ulcerated bowenoid actinie keratosis                                                                                                                                | pre malignant |

| Regiune anatomică        | Biopsie                                                | Excizie                                                                                                                                                                                   | Stadializarea TNM |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Preauriculară dreaptă    | Carcinom scuamos bine diferențiat, invaziv superficial | Carcinom scuamos bine diferențiat, keratoacantoma-like, cu leziuni asociate de carcinom in situ (intraepitelial), keratoză actinică bowenoidă și proliferativă, cu caracter multifocal    | pT1               |
| Șanț nazolabial superior | Benign                                                 | Nev intradermic                                                                                                                                                                           | Benign            |
| Șanț nazolabial inferior | Carcinom bazocelular                                   | Carcinom bazocelular nodular, multifocal                                                                                                                                                  | pT1               |
| Presternal               | Carcinom scuamos bine diferențiat                      | Carcinom scuamos bine diferențiat, cu leziuni asociate de carcinom în situ, keratoză actinică proliferativă; invazie limfo-vasculară prezentă (LVI 1), invazie perineurală prezentă (Pnl) | pT1               |
| Umărul stâng             | Carcinom bazocelular                                   | Carcinom bazocelular, nodular, ulcerat                                                                                                                                                    | pT1               |
| Infraorbital stâng       | Keratoză actinică cu plasmocitoză                      | Keratoză actinică bowenoidă ulcerată                                                                                                                                                      | pre malignă       |

**Pagina (page) 19**

- Fig 6. Well differentiated squamous cell carcinoma, H.E x 20.  
Fig 6. Carcinom scuamos bine diferențiat, col H.E x 20.
- Fig 7. Well differentiated squamous cell carcinoma, H.E x 10.  
Fig 7. Carcinom scuamos bine diferențiat, col H.E x 10.
- Fig. 8. Adipose tissue invasion of squamous cell carcinoma.  
Fig 8. Carcinom scuamos cu invazie în țesutul adipos.
- Fig. 9. Small nerve bundle with perineural invasion of squamous cell carcinoma (nerve bundle diameter < 0.1 mm)  
Fig 9. Invazie perineurală de carcinom scuamos (filet nervos < 0.1 mm)
- Fig. 11. Proliferative actinic keratosis, H.E x 10.  
Fig 11. Keratoză actinică proliferativă, col. H.E x 10.

**Pagina (page) 20**

- Fig. 12. Ulcerated bowenoid actinic keratosis, H.E x 10.  
Fig. 12. Keratoză actinică bowenoidă ulcerată, H.E x 10.